


## Njivska pasja kamilica

*Anthemis arvensis* L.

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost



Obdobje vznikanja

### Prag škodljivosti

**Splošno** Enoletna ali dvoletna rastlina, pogosta na lažjih tleh, tudi v težjih ob ugodnih temperaturnih pogojih, je indikator kislih tal.

**Rastišče** Njivske površine (žita, krompir,...), zapuščena, neobdelana območja.

### Mlada rastlina

Klični listi so majhni, eliptični in sedeči. Prvi pravi listi so deljeni v 5 rogljev in so pokriti z dlačicami.

**Odrasla rastlina** Odrasla rastlina meri v višino od 20 - 50 cm. Steblo je običajno pri dnu razvejano, tako stebela kot listi so prekriti z drobnimi dlačicami. Listi so na steblo nameščeni premenjalno, so kratkopecljati. Listna ploskev je globoko deljena v ozke, eliptične roglje, ki se na koncu zaključijo s kratko konico.

**Cvetenje** Rastlina običajno cveti konec pomladi in poleti. Koškasta socvetja, velika od 2 - 4 cm, se nahajajo na koncih poganjkov. Socvetja imajo bele jezičaste cvetove in rumene cevaste cvetove, podprte s širokimi krovnimi luskami.

**Razmnoževanje** Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi so rožke, so štiriroke z 8 do 10 vzdolžnimi izboklinami.

**Posebnosti** Je brez vonja. Je zdravilna in ugodna za čebeljo pašo.

**Zatiranje** Mehansko zatiranje je dovolj dober ukrep za zmanjšanje prisotnosti te vrste.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.