


Navadna kostreba

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

Splošno Enoletna trava, ki vznikaja od sredine pomladi do jeseni. Je termofilna rastlina. Pogosta je v toplih in vlažnih tleh.

Rastišče Njivske površine (okopavine), strnišča, namakane površine, vlažna zapuščena območja.

Mlada rastlina Najmanjši listi so zviti okrog bili, listna ploskev je gola, listna nožnica sploščena. Novi poganjki pogosto najprej rastejo navzven ob tleh, preden začnejo z rastjo navzgor. Listi navadne kostrebe nimajo listne kožice in ušesc. Na listih mlade rastline je rdečkastorjava proga.


Odrasla rastlina Odrasle rastline so lahko velike do 80 cm in se lahko po videzu močno razlikujejo. Rastlina je šopasta, s pokončnimi ali kipečimi stebli, ki so pri bazi sploščeni. Listi so široki, pri dnu belkasti in svetleči. Listna ploskev je navadno gola.

Cvetenje Rastlina cveti od poletja do jeseni. Socvetje je stisnjen lat iz pokončnih stranskih klaskov, ki so zelene do rdečkaste barve. Klaski so veliki od 2 do 4 mm in so štrleče dlakavi. Klaski imajo lahko kratko ali dolgo plevo. Zgornji klasi so bolj pokončni, medtem ko so spodnji umaknjeni od cvetnega stebela.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom.

Posebnosti Ponekod (v ZDA) se rastlino goji za krmo živali. Je prenašalec nekaterih vrst nematod.

Zatiranje Kolobar, prekopavanje tal, ročno odstranjevanje rastlin, kemično varstvo.



Pripravil: Andrej Vončina

2017- Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.