


Vejicati rogovilček

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.



| | |
|---|-----------------|
| 1 | zelo pomembna |
| 2 | pomembna |
| 3 | manj pomembna |
| 4 | nepomembna |

Gospodarska pomembnost

Prag škodljivosti

17 rastlin/m²

Splošno

Enoletna poletna rastlina, ki izvira iz Amerike. Uspeva na z N bogatih tleh.

Rastišče

Njivske površine, vrtovi, ruderalna območja.

Mlada rastlina

Klični listi so pri vrhu priostreni, so dokaj veliki in pecljati. Prvi pravi listi so celi, eliptično ovalne oblike z nazobčanim robom.

Odrasla rastlina

Rastlina v višino zraste do 60 cm. Steblo je pri dnu razvejano, je redko dlakavo. Listi so nameščeni nasprotno, redko dlakavi, celi, nazobčani, široki, ovalno trikotne oblike, pecljati. Pri vrhu so koničasti. Na spodnji listni ploskvi so izrazito vidne listne žile.

Cvetenje

Rastlina cveti poleti do pozne jeseni. Cvetovi so na koncih poganjov nameščeni v socvetjih - koških, velikih od 6 - 7 mm. Barva socvetja je bela (jezičasti cvetovi) z rumenim notranjim delom iz cevastih cvetov.

Razmnoževanje

Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi so oreški, obdani z resastimi luskami.

Posebnosti

Zatiranje

Mehansko zatiranje in solarizacija so učinkoviti pri zatiranju rogovilčka. Plevel je občutljiv na sintetične avksine in na večino kontaktnih in tudi dalj časa delujočih herbicidov.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.