Golo proso

Panicum dichotomiflorum Michx.

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	**manj pomembna**
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost



Obdobje vznikanja

Splošno Golo proso je enoletna toploljubna trava iz družine trav (Poaceae). Je poletni plevel, ki vznikne pozno spomladi, predvsem od maja naprej, vznik pa se lahko nadaljuje tudi poleti. Zaradi hitre rasti in velike tekmovalne sposobnosti je lahko pomemben plevel predvsem v koruzi in drugih okopavinah.



Rastišče Njive, predvsem koruzne, druge okopavine, vrtovi, obrobja njiv, jarki in ruderalna območja. Ustrezajo mu predvsem vlažna, rodovitna in s hranili dobro preskrbljena tla.

Mlada rastlina Najmanjši list je zvit okrog bili. Listna nožnica je valjasta. Listna ploskev je bolj ali manj prekrita z dlačicami. Jeziček je obdan z vrsto dlak, ušesc ni.

Odrasla rastlina Rastlina v višino zraste do 150 cm. Steblo je pokončno, s svetlečimi in golimi kolenci. Listi imajo pogosto izrazito široko srednjo žilo. Listi so pri jezičku rahlo dlakavi. Listna nožnica pogosto vijolična in običajno gola.



Cvetenje Cveti predvsem od julija do septembra. Socvetje je lat, ki je velik, rahel in močno razvejan. Vejice lata so sprva bolj pokončne, pozneje pa razprte. Klaski so drobni, jajčasti do eliptični in nameščeni na kratkih pecljih na končnih delih vejic.

Razmnoževanje Klasek je ozek, jajčast velik od 2 do 3 mm. Klasek je dvocveten, en cvet je sterilen. Ob dozoritvi odpade celoten klasek.

Zatiranje Pomembno je preprečevanje semenitve in povečevanja zaloge semen v tleh. Učinkoviti so ustrezen kolobar, obdelava tal, slepa setev, okopavanje ter vzdrževanje gostega in konkurenčnega posevka. Ker lahko vznikne razmeroma pozno in v več zaporednih valovih, je treba zatiranje prilagoditi daljšemu obdobju vznikanja. V poljščinah je možno tudi kemično zatiranje z registriranimi herbicidi za enoletne ozkolistne plevele.

Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.