

## Navadni pelin

*Artemisia vulgaris* L.

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	<b>manj pomembna</b>
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost



J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

### Prag škodljivosti

#### Splošno

Zelnata trajnica, ki se pojavlja po vsej Sloveniji. Je nitrofilna rastlina. Posebej bujna, ko odganja iz podzemnih založnih organov.

#### Rastišče

Ruderalna območja, travniki, vrtovi, njivske površine, trajni nasadi.

#### Mlada rastlina

Klični listi so so majhni, celi, ovalni, brez peclja. Klični listi kmalu odpadejo. Prvi pravi listi so suličaste do narobe jajčaste oblike, listni rob je nazobčan. Klični in prvi listi so gosto porasli z značilnimi pajčevinastimi dlačicami.

#### Odrasla rastlina

Rastlina lahko zraste od 50 do 150 cm, rast je bujna, s prisotnimi pritlikami. Stebla so značilne rjavo rdečkaste barve, močno olistana. Listi odrasle rastline so deljeni, pernato narezani. Segmenti lista so suličaste oblike, proti vrhu so vse ožji. Zgornja listna ploskev je zelena, spodnja pa belkasta zaradi gostih pajčevinastih dlačic.

#### Cvetenje

Rastlina cveti v od pozne pomladi do poznega poletja. Cveti kasneje kot pravi pelin. Cvetovi so nanizani v dolgih klasastih socvetjih. Posamezni cvetovi so majhni, v volnatih skupkih.

#### Razmnoževanje

Rastlina se razmnožuje s semeni in vegetativno z rizomi. Plodovi navadnega pelina so majhne rožke. Seme je paličaste oblike, drobno.

#### Posebnosti

Rastlino pogosto zamenjujejo s pravim pelinom (*Artemisia absinthium* L.).

#### Zatiranje

Ročno puljenje posameznih rastlin, okopavanje, oranje in redna košnja robov polj so običajno dovolj učinkoviti ukrepi za zatiranje navadnega pelina.



Oblika kličnega in pravega lista



Pripravil: Andrej Vončina

2018 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.