

## Navadni čapljevec

### *Erodium cicutarium* L'Hér. ex Aiton

J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

**Splošno** Enoletna prezimna enoletna širokolistna rastlina ali dvoletna rastlina. Uspeva predvsem na suhih, lahkih tleh.

**Rastišče** Robovi njivske površine, travniki, pašniki, ruderalna območja.

**Mlada rastlina** Klični listi so značilne oblike – trokrpi, na dolgem peclju. Prvi pravi listi so pernato deljeni, bolj ali manj dlakavi. Mlada rastlina raste v obliki rozete.


**Odrasla rastlina** Odrasla rastlina lahko v višino zraste od 0,5 m do 1 m. Rastlina je polegla ali pa pokončna, steblo je enostavno ali razvejano, prekrito z dlačicami. Listi so pernato deljeni, listni rob je nazobčan. Listi so dlakavi, pri žilah pogosto rdečkaste barve.

**Cvetenje** Rastlina cveti od pozne pomladi do konca poletja. Cvetovi so posamezni ali po več v kobulih nameščeni na vrhu cvetnega stebela. Cvetovi so rožnate do rdečkaste barve, z dlakavim pecljem, ki je običajno večji od cvetnih listov (10-20 mm).

**Razmnoževanje** Rastlina se razmnožuje s semeni. Plodovi imajo kljunec, s katerim se, ko so posušena, zakopljejo v tla. Semena so podolgovata, gladka.

#### Posebnosti

**Zatiranje** Mehansko zatiranje pred semenjem je pogosto dovolj učinkovit ukrep.



Pripravil: Andrej Vončina

2020 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.