


Navadna rosnica *Fumaria officinalis* L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Enoletna, lahko prezimna enoletna širokolistna rastlina, ki je pogosto prisotna na kmetijskih, predvsem njivskih površinah.

Rastišče Njivske površine – predvsem žita, trajni nasadi, vrtovi.

Mlada rastlina Klični listi so dolgi in ozki, igličasti, do desetkrat tako dolgi kot široki. Prvi pravi listi so pernato deljeni, pecljati.


Odrasla rastlina Odrasla rastlina raste poleglo do vzpenjavo.. V višino zraste od 10 do 70 cm. Steblo je pokončno, razvejano in golo. Spodnji listi rastejo v rozeti, so modrikasto zelene barve, dvakrat pernato deljeni. Srednji listi so modrozeleni, prekriti s poprhom, 1 do 4 krat pernato deljeni, roglji so zelo ozki.

Cvetenje Rastlina cveti od sredine pomladi do sredine jeseni. Cvetovi so nanizani v grozdastih cvetovih na vrhu stebela ali pa izraščajo iz zalistja. Cvetovi so rožnate do škrlatne barve.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semeni. Plodovi – enosemenske glavice so na vrhu sploščene, okrogle, pri vrhu običajno z dvema jamicama.

Posebnosti Uporabljena v ljudski medicini.

Zatiranje Zatiranje zaradi majhne populacije običajno ni potrebno. Možno je mehansko zatiranje pred cvetenjem, na voljo so tudi kemični pripravki, ki dobro učinkujejo na velikost populacije plevela.



Pripravil: Andrej Vončina

2020 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.