


Navadna škrbinka *Sonchus oleraceus* L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Enoletna ali prezimna enoletna rastlina, pogosta na kmetijskih zemljiščih. Uspeva na vseh tipih tal, čeprav najpogosteje raste na ruderalnih zemljiščih.

Rastišče Njivske površine, sadovnjaki, travniki, pašniki, ruderalna območja.

Mlada rastlina Klični listi so jajčaste oblike, gladki, dolgi do 5 mm, pecljati. Prvi pravi listi so jajčaste oblike, poraščeni s dlakami, listni rob je nazobčan. Listi so na steblo nameščeni premenjalno.


Odrasla rastlina Odrasla rastlina lahko v višino zraste do 1 m visoko. Rast je pokončna, stebela so gladka, močna, v kolencih votla, ob ranitvi se izloči bel mleček. Listi so brez dlak, mehki, zeleno sive barve, pernato nacepljeni. Zgornji listi so manjši od spodnjih in objemajo steblo s puščičastim dnom. Spodnji listi so dolgi do 20 cm, s prisekanim dnom

Cvetenje Rastlina cveti od pozne pomladi do jeseni, ob ugodnih pogojih v toplejših območjih skozi celo leto. Cvetovi so nameščeni na koncih stebel v bledorumenih koških, velikih do 15 mm. Cvetove sestavljajo številni jezičasti cvetovi.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi so rožke s kodeljico. Semena se prenašajo z vetrom.

Posebnosti Lahko je gostitelj rastlinskih boleznih in škodljivcev.

Zatiranje Ker navadna škrbinka ni pogost plevel, zatiranje običajno ni potrebno. Ob preveliki razrasti pa so učinkoviti standardni postopki – pravi kolobar, mehansko in kemično zatiranje.



Pripravil: Andrej Vončina

2020 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.