

FUNGICIDI ZA KORUZO

Iz registra FFS, 13. 1. 2022

Pripravek	Aktivna snov (delež %)	FRAC ¹	Odmerek L, kg / ha	Karenca dni	Bolezni
Prosaro	protriokonazol 12,5 tebukonazol 12,5	3 3	1,0	56	Za zatiranje fuzarioz na stebli in storžu (<i>Fusarium</i> spp.) pri porabi vode 200-600 L/ha. Tretiranja se opravi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Koruzo se tretira ob uporabi ustrezne mehanizacije v razvojni fazi od zaznavnega tretjega kolena do konca cvetenja (svila povsem suha), BBCH 33-69.
Propulse	protriokonazol fluopiram	3 7	1,0	42	Za zatiranje očesne pegavosti koruze (<i>Kabatiella zae</i>), koruzne pegavosti (<i>Setosphaeria turcica</i>) in zmanjševanje okužb helmintosporiuma (<i>Cochliobolus carbonum</i>); poraba vode 200-400 l/ha. Tretira se od fenofaze začetek rasti stebela, do konca cvetenja (svila povsem suha, BBCH 30-69).
Polyversum	Pythium oligandrum M1		0,1	1	Za zatiranje fuzarioz. S sredstvom se tretira foliarno, na prostem. Tretira se v razvojni fazi od začetka cvetenja, ko so pri moških cvetovih vidni prašniki v sredini metlice in ko pri ženskih cvetovih konica klasa (storžka) vznikla iz listne nožnice, do konca cvetenja, ko je svila povsem suha (BBCH 61-69).
MAXIM QUATTRO	Azoksistrobin 1,5 Fludioksonil 3,75 metalaksil-M 2,9 tiabendazol 30	C/11 E/12 A/4 B/1	0,0085 l	/	Za vlažno tretiranje semena koruze za zatiranje fuzarioz (<i>Fusarium</i> spp.) in koreninske gnilobe (<i>Rhizoctonia</i> sp.) ter za zmanjševanje okužb z glivami iz rodu <i>Pythium</i> (<i>Pythium</i> spp.)
MAXIM XL 035 FS	Fludioksonil 2,5 metalaksil-M 0,969	E/12 A/4	12,5 mL/50k zrn koruze	/	Uporablja se kot fungicid za vlažno razkuževanje semena koruze za zmanjševanje okužb s fuzariozami (<i>Fusarium</i> spp.) in padavico (<i>Pythium</i> spp.)