

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA AMERIŠKIH BOROVNICAH

Podatki iz registra FSS, 10.1.2022

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek L, kg / ha	Karenca dni	Bolezni	Razvrstitev po FRAC ¹
Folicur EW 250	tebukonazol	0,8	čas uporabe	cvetna monilija	G/3
Mavita 250 EC	difenkonazol	0,4			G/3
Score 250 EC					
Teldor SC 500	fenheksamid	1,5	3	siva plesen	G/17
Switch 62,5 WG	ciprodinil fludioksonil	1	10		D/9 E/12
Stroby WG	krezoksim-metil	0,2	21	ameriška kosmuljeva pepelovka in pepelovke iz rodu <i>Microsphaera</i>	C/11
Signum	boskalid piraklostrobin	1	7	siva plesen, antraknoza in ribezova listna pegavost	C/7 C/11
Champion 50 WG	baker v obliki bakrovega hidroksida	0,75	čas uporabe	odmiranje stebel borovnic, sušenje vej na borovnicah	M1
Cuprblau 35 WG, Cuprblau 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida	2-3		cvetna monilija na borovnicah, črna pegavost, koreninska gniloba borovnic, listne begavosti iz rodu <i>Mycosphaerella</i> , odmiranje stebel borovnic, sušenje vej na borovnicah, bakterijske pegavosti iz rodu <i>Pseudomonas</i> ,	
Biotip Sulfo 800 SC	žveplo	2-2,4	7	ameriška kosmuljeva pepelovka	M/M02
Thiovit Jet		4-5		Pepelovke,	
Microthiol Disperss		7		Pepelovke iz rodu <i>Erysiphe</i>	
Microthiol Special				M/M02	
Serenade ASO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713 <i>subtilis</i>	8	ni potrebna	siva plesen, ameriška kosmuljeva pepelovka	BM/BM02

Taegro	Bacillus amyloliquefaciens str. FZB24	0,185- 0,37	1	siva plesen	BM/BM02
--------	---------------------------------------	----------------	---	-------------	---------

¹ razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombinirati snovi z različnimi načini delovanja.