


Plazeči skrečnik

Ajuga reptans L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Plazeči skrečnik je trajnica iz družine ustnatic (Lamiaceae). Je nizka rastlina, ki se značilno vegetativno razrašča z dolgimi nadzemnimi pritlikami, ki se na kolencih ukoreninjajo. Pojavlja se predvsem na travnikih in drugih nekoliko vlažnih rastiščih, na njivah pa je manj pomemben plevel. Iz semena vznikne predvsem spomladi, obstoječe rastline pa začnejo odganjati zgodaj spomladi. Razširjen je po vsej Sloveniji.

Rastišče Travniki, pašniki, vrtovi, sadovnjaki, gozdni robovi, svetli gozdovi, obrobja njiv ter druga sveža do vlažna rastišča.

Mlada rastlina Mlade rastline razvijejo pritlično listno rozeto. Listi so nasprotni, narobe jajčasti do lopatičasti, pri dnu zoženi v listni pecelj. Listni rob je celorob ali plitvo topo nazobčan. Listi so zeleni, pri nekaterih rastlinah tudi nekoliko rdečkasto ali vijoličasto obarvani.


Odrasla rastlina Odrasla rastlina razvije pokončna cvetna stebila, visoka približno od 10 do 30 cm, ter dolge plazeče pritlike. Steblo je štiri robo in dlakavo predvsem na dveh nasprotnih straneh. Listi so nasprotni. Pritlični listi so pecljati, narobe jajčasti do lopatičasti, stebelni listi pa so manjši in s krajšimi peclji ali skoraj sedeči.

Cvetenje Cveti predvsem od aprila do junija. Cvetovi so modri do modrovijolični, redkeje rožnati ali beli, dvoustnati in združeni v navidezna vretenca v zalistjih podpornih listov. Zgornja ustna venca je zelo kratka, spodnja pa izrazito trikrpa.

Razmnoževanje Razmnožuje se s semenom in vegetativno s plazečimi pritlikami, ki se na kolencih ukoreninjajo in tvorijo nove rastline. Plod je pokovec, ki ob zrelosti razpade na štiri enosemenske plodiče (merikarpe).

Posebnosti Značilna lastnost vrste so dolge nadzemne pritlike, s katerimi lahko rastlina hitro preraste večjo površino. Je medonosna rastlina in pomemben spomladanski vir hrane za čebele in druge opraševalce.

Zatiranje Na njivskih površinah navadno ne predstavlja pomembnega plevela. Kjer se močneje razraste, je pomembno odstranjevanje ukoreninjenih pritlik in preprečevanje njihovega nadaljnjega širjenja. Učinkoviti so obdelava tal, okopavanje in vzdrževanje gostega, konkurenčnega posevka.



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.