


## Jesenski podlesek

### *Colchicum autumnale* L.



|   |               |
|---|---------------|
| 1 | zelo pomembna |
| 2 | pomembna      |
| 3 | manj pomembna |
| 4 | nepomembna    |

Gospodarska pomembnost

**Splošno** Jesenski podlesek je trajnica iz družine podleskovk (Colchicaceae). Je značilna rastlina vlažnih travnikov in pašnikov. Rastlina je zelo strupena in predstavlja težavo predvsem na travnikih, namenjenih pridelavi krme.

**Rastišče** Vlažni do zmerno vlažni travniki, pašniki, gozdni robovi in svetli gozdovi. Pogost je predvsem na svežih, globljih in s hranili dobro preskrbljenih tleh.

**Mlada rastlina** Spomladi iz tal požene več pokončnih listov, ki so sprva tesno zviti skupaj. Listi so široko suličasti do podolgovato suličasti, celorobi, goli, mesnati in bleščeče zeleni. Med listi se razvija plod, medtem ko cvetov v tem obdobju ni.


**Odrasla rastlina** Spomladi rastlina razvije navadno tri do šest velikih, pokončnih listov, dolgih približno 20 do 40 cm. Listi obdajajo razvijajoči se plod. Po dozorevanju plodov listi porumenijo in odmrejo. Rastlina ima pod zemljo gomolj, obdan s suhimi rjavimi ovoji, v katerem shranjuje rezervne snovi in prezimi.

**Cvetenje** Cveti od avgusta do oktobra. Cvetovi se pojavijo neposredno iz tal, ko listov praviloma ni več. So veliki, rožnati do vijoličastorožnati, lijakasti in imajo šest podobnih cvetnih listov. Dolga cev cvetnega odevala sega do podzemnega dela rastline.

**Razmnoževanje** Razmnožuje se s semenom in vegetativno z nastajanjem hčerinskih gomoljev. Po oploditvi ostane plodnica čez zimo pod zemljo, spomladi pa se razvijajoči plod skupaj z listi dvigne nad površino tal. Plod je glavica, ki vsebuje številna okroglasta, temnorjava semena.

**Posebnosti** Jesenski podlesek je v celoti zelo strupen, pri čemer vsebuje alkaloid kolhicin in sorodne spojine. Strupeni so tudi posušeni deli rastline, zato se strupenost s sušenjem sena ne odpravi. Posebej značilen je nenavaden razvojni krog: listi in plodovi se pojavijo spomladi, medtem ko rastlina cveti šele jeseni, ko listov ni več. Zaradi strupenosti je njegova prisotnost posebej nezaželena na površinah za pridelavo krme.

**Zatiranje** Na travnikih je pomembno preprečevati njegovo širjenje in tvorbo semen. Posamezne rastline je mogoče odstranjevati mehansko, pri čemer je treba odstraniti tudi podzemni gomolj. Ponavljajoča se zgodnja košnja oziroma odstranjevanje listov lahko postopoma izčrpa zaloge v gomolju. Pri močnejši zapleveljenosti je treba prilagoditi način rabe travinja in preprečiti, da bi rastlinski deli prišli v seno ali drugo krmo.



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.