Kmetijski inštitut Slovenije
Oddelek za varstvo rastlin

Navadna krvenka

Lythrum salicaria L.

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	**manj pomembna**
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

Splošno Navadna krvenka je trajnica iz družine krvenkovk (Lythraceae). Je robustna in dobro konkurenčna rastlina, ki lahko na ustreznih rastiščih tvori goste sestoje.

Rastišče Vlažni in močvirni travniki, jarki, obrežja rek, potokov in stoječih voda, poplavne površine ter druga vlažna, s hranili dobro preskrbljena tla. Občasno se pojavlja tudi na vlažnih njivah in ob njihovih robovih.

Mlada rastlina Mlade rastline imajo sprva majhne, podolgovate liste. Z nadaljnjim razvojem postanejo listi suličasti, celorobi in sedeči. Na spodnjem delu stebla so navadno nameščeni nasprotno ali po trije v vretencu. Mlade rastline so zelene, steblo pa lahko že zgodaj dobi rdečkast nadih.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina zraste približno od 50 do 150 cm, v ugodnih razmerah tudi več. Steblo je pokončno, čvrsto, navadno razvejano v zgornjem delu in štiri- do večrobo. Pogosto je rdečkasto obarvano. Listi so sedeči, suličasti do podolgovato suličasti, celorobi in pri dnu srčasti. Spodnji listi so nasprotni ali razvrščeni v vretencih, zgornji pa so lahko premenjalni.

Cvetenje Cveti od junija do septembra. Cvetovi so škrlatnordeči do rožnato vijoličasti in imajo navadno šest venčnih listov. Združeni so v gosto, podolgovato, klasasto socvetje na vrhu stebla in stranskih poganjkov.

Razmnoževanje Razmnožuje se predvsem s semenom, lahko pa se obnavlja tudi iz podzemnih delov. Plod je glavica, ki vsebuje veliko število zelo drobnih semen. Semena se širijo predvsem z vodo, pa tudi z zemljo in človekovo dejavnostjo. Posamezna dobro razvita rastlina lahko tvori zelo veliko semen.

Posebnosti Vrsta je pomemben vir nektarja za čebele, čmrlje in metulje.

Zatiranje Na naravnih mokrotnih rastiščih zatiranje praviloma ni potrebno. Kadar se pojavlja kot nezaželena rastlina na kmetijskih površinah, je posamezne rastline najbolje odstraniti pred tvorbo semen, pri čemer je treba odstraniti tudi podzemni del. Pri večjih sestojih so potrebni ponavljajoči se mehanski ukrepi. Posebno pozornost je treba nameniti preprečevanju semenitve, saj rastlina tvori veliko število drobnih semen.





Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.