


Lasasto proso

Panicum capillare L.



1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Lasasto proso je enoletna toploljubna trava iz družine trav (Poaceae). Je poletni plevel, ki začne vznikat pozno spomladi, predvsem od maja naprej, ko se tla dovolj segrejejo, vznik pa se lahko nadaljuje tudi poleti. Pojavlja se predvsem v okopavinah in drugih spomladi sejanih kulturah. Dobro prenaša sušne in tople razmere ter lahko na ugodnih rastiščih tvori številna semena.

Rastišče Njive, predvsem koruza in druge okopavine, vrtovi, vinogradi, obrobja njiv, nasipi, obcestne površine ter druga suha, topla in ruderalna rastišča. Uspeva na različnih tipih tal, pogosto na peščenih in dobro odcednih tleh.


Mlada rastlina Mlade rastline so svetlo do srednje zelene. Najmlajši list je zvit. Listne ploskve so ploščate, razmeroma široke in značilno porasle z dolgimi, mehкими dlačicami. Dlakave so tudi listne nožnice. Listna kožica je nadomeščena z vencem dlačic, ušesca manjkajo. Zaradi izrazite dlakavosti je vrsta dobro prepoznavna že zgodaj.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina je šopasta in navadno zraste od 20 do 80 cm, v ugodnih razmerah tudi več. Steblo je pokončno do kipeče in razvejano pri dnu. Listne ploskve so ploščate, približno od 5 do 15 mm široke in na obeh straneh porasle z dolgimi dlačicami. Listne nožnice so prav tako izrazito dlakave.

Cvetenje Cveti predvsem od julija do septembra. Socvetje je zelo velik, rahel in močno razvejan lat, ki lahko obsega velik del višine rastline. Vejice lata so zelo tanke, lasaste in široko razprostrte. Klaski so majhni, nameščeni na koncih dolgih in tankih vejic. Zreli lati se lahko odlomijo in jih veter kot celoto prenaša po površini.

Razmnoževanje Razmnožuje se s semenom. Plod je zrno, značilno za družino trav. Posamezna dobro razvita rastlina lahko tvori veliko število semen. Semena se širijo z vetrom, vodo, zemljo in kmetijsko mehanizacijo.

Zatiranje Pomembno je preprečevanje semenitve in povečevanja zaloge semen v tleh. Učinkoviti so ustrezen kolobar, obdelava tal, slepa setev, okopavanje ter vzdrževanje gostega in konkurenčnega posevka. Ker vznik poteka razmeroma pozno in lahko traja daljše obdobje, je pri mehanskem zatiranju pogosto potrebnih več ukrepov. V poljščinah je možno tudi kemično zatiranje z registriranimi herbicidi za enoletne ozkolistne plevel.



Pripravil: Andrej Vončina

2026 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.