


## Golo proso

*Panicum dichotomiflorum* Michx.



1	zelo pomembna
2	<b>pomembna</b>
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

### Prag škodljivosti

5 - 8 rastlin/m<sup>2</sup>

### Splošno

dobro založenih tleh.

Enoletna trava. Uspeva na v z vodo

### Rastišče

območja

Njivske površine, ob vodah, zapuščena

### Mlada rastlina

Najmanjši list je zvit okrog bili. Listna nožnica je valjasta. Listna ploskev je bolj ali manj prekrita z dlačicami. Jeziček je obdan z vrsto dlak, ušesc ni.

### Odrasla rastlina

Rastlina v višino zraste do 150 cm. Steblo je pokončno, s svetlečimi in golimi kolenci. Listi imajo pogosto izrazito široko srednjo žilo. Listi so pri jezičku rahlo dlakavi. Listna nožnica pogosto vijolična in običajno gola.

### Cvetenje


Klaski do nameščeni na latistem socvetju, po izgledu piramidastem ali trikotnem. Vejice klaskov so kratke, debele.

### Razmnoževanje

Klasek je ozek, jajčast velik od 2 do 3 mm. Klasek je dvocveten, en cvet je sterilen. Ob dozoritvi odpade celoten klasek.

### Zatiranje

Mehansko zatiranje z oranjem in prekopavanjem, širok kolobar, zgodnejše sejanje lahko dobro zaustavijo širjenje plevela po kmetijski površini. Rastlino učinkovito kemično zatiramo v širokolistnih kulturnih rastlinah, težje v ozkolistnih (koruza).



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije in University of Missouri (označeno na sliki). Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.