

## OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

1. april 2019

Vinska trta je sedaj večinoma v obdobju razvoja brstov. Na toplejših legah se pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, brsti že odpirajo. V tem obdobju je čas za uporabo žveplovih pripravkov za zatiranje trsnih listnih pršic šiškarič (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol Special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku do 8 kg/ha. Žveplovi pripravki delujejo tudi proti **oidiju** ter zmanjšujejo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**. Za učinkovito delovanje žveplovih pripravkov morajo temperature podnevi dosegati vsaj 15 °C.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**



Slika: V razvojni fazi brstenja je čas za zatiranje škodljivih pršic na vinski trti

Besedilo: Primož Žigon