

**OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE**

8. april 2019

V hladnem in deževnem vremenu, ko brstenje ter razvoj mladik vinske trte poteka počasneje, lahko pričakujemo večji pojav poškodb zaradi **pršic trsne kodravosti (akarinoza)** in **trsnih listnih pršic šiškaric (erionza)**. Predvsem tam, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev, za njihovo zatiranje v času odpiranja brstov svetujemo uporabo registriranih žveplovih pripravkov kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah zraka nižjih od 15 °C zaradi slabšega delovanja žveplovih pripravkov njihova uporaba ni smiselna. V tem primeru lahko škodljive pršice zatirate tudi kasneje, pri velikosti poganjkov 2 do 5 cm z uporabo pripravka **Vertimec Pro** v 0,1 % koncentraciji. Sicer pa žveplovi pripravki delujejo tudi proti **oidiju** ter zmanjšujejo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**. Slednja se ohranja na okuženih rozgah, zato je pojav pogostejši, v vinogradih kjer je bila bolezen v preteklih letih že prisotna. Gliva okužuje mlade poganjke ob brstenju, predvsem, če takrat pogosteje dežuje. Za okužbe so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Za varstvo pred črno pegavostjo uporabite pripravke kot so **Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF** ali katerega od registriranih **bakrovih pripravkov**. Priporočamo dvakratno škropljenje, ki ga prvič opravite, ko so mladike dolge 1-2 cm in ga čez 7-10 dni ponovite. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami!

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Besedilo: Primož Žigon