

**Zatiranje plevelov v žitih**

10. april 2019

Pridelovalcem ozimnih žit, ki še niste opravili škropljenja proti plevelom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo vremenske razmere dopuščale. Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji ozimna žita sedaj večinoma začenjajo s kolenčenjem ali imajo že razvito prvo kolence (odvisno od vrste, lege, sorte, tehnologije pridelave). Pleveli so marsikje veliki in močno konkurirajo žitom za prostor, svetlobo in hranila, hkrati pa postajajo manj občutljivi na delovanje herbicidov. V posevkih, kjer se pojavljajo običajni žitni pleveli kot so mrtva kopriva, njivska vijolica, navadna zvezdica, veronike, plešec in podobni lahko do faze prvega oz. drugega kolenca še uporabite pripravke kot so **Mustang 306 SE, Duplosan KV** ali **Sekator OD**, še nekoliko pozneje (najpozneje do razvoja zastavičarja BBCH 37-39) pa herbicide kot so **Axial one, Biathlon 4D, Boudha, Ergon, Hussar plus, Saracen max** in nekatere pripravke na osnovi aktivne snovi fluroksipir (**Bonaca, Flurostar, Starane forte, Tandus**). Slednji dobro zatirajo smolenec!

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Pripravek	Kg,l/ha	Uporaba	Čas rabe BBCH	Pripravek	Kg,l/ha	Uporaba	Čas rabe BBCH
Alliance	0,1	P, J, R, T	13-29	Flurostar 200	0,75-1,0	P, J, R, T, JJ, JP	13-31; jarine 12-39
Alister grande	0,8	P, T	do 28	Granstar super 50 SX	0,06	P, J, R, T, O	17-32
Alister new	1,0	P	12-29	Grodyl	0,04	P, J, R, T, O	13-37
Ally SX	0,03	P, J, R, T, O	12-39	Hussar OD	0,1	P, J, R, T	21-37 oz. 13-29
Arrat	0,2	P, J	13-30	Hussar plus	0,15-0,20	P, R, T, JJ	13-32; jarine 13-30
Axial one	1	P, J, JP, JJ	13- 37	Lontrel 100	1,0-1,2	P	21-31
Axial	0,6-1,2	P, J, JJ	13-39	Lontrel 72 SG	0,17	P, J, O	21-31
Biathlon 4D	0,07	P, J, R, T, O	13-39	Mezzo	0,02-0,03	P, J, T, O	13-39
Basagran, Basagran 480	2,0	P, J, R, T, O	12-30	Mustang 306 SE	0,4-0,6	P, J, JP	21-31
Bizon	1,0	P, J, R, T	11-23	Pallas 75 WG	0,12-0,25	P, R, T	12-32
Bonaca	0,6-0,8	P, J	12-39	Saracen max	0,025	P, J, R, O, T	12-39 jarine 12-32
Boudha	0,02	P, J, R, T, O	21-39	Savvy	0,03	P, J, T, O	13-37
Cliophar 600 SL	0,16-0,2	P, J	21-31	Sekator OD	0,1-0,15	P, J, R, T	25-32
Corida	0,02	P, J; JP, JJ	31-39	Starane forte	0,54	P, J, R, T, O	21-32
Duplosan KV	2	P, J	13-31	Stomp aqua	2,9	P, J, R, T, JJ	do 30, jarine pred

							vznikom
<b>Ergon</b>	0,06-0,07	P, JP, JJ	12-39	<b>Tandus 200 EC</b>	0,75-2,0	P, J, R, T, O	13-39
<b>Esteron</b>	0,75-1,0	P, J, T, JP	22-32	<b>TBM 75 WG</b>	0,02	P, J, R, T, O	12-33
<b>Finy</b>	0,03	P, J, T	23-39	<b>U 46 M-fluid</b>	1,0	P, J, R, T	23-39
<b>Flame</b>	0,03	P, J, JJ	13-39				
<p>P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves; JJ-jari ječmen, JP-jara pšenica  BBCH razvojni stadiji: 13-29 = od tretjega lista do konca razraščanja; 30 = začetek kolenčenja; 37 = viden vrhni list (zastavičar); 39 = zastavičar razvit</p>							