

## OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

15. april 2019

Na večini vinorodnih območji po Sloveniji je glavčina sort vinske trte še v fazi brstenja. Ko bodo poganjki dosegli velikost 1-2 cm bo čas za škropljenje proti **črni pegavosti vinske trte**. Gliva okužuje mladice v vlažnem vremenu, za okužbe pa so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. V vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjene bolezni, priporočamo dvakratno škropljenje v razmiku 7-10 dni z enim od registriranih kontaktnih fungicidov kot so **Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF**. Uporabite lahko tudi katerega od registriranih **bakrovih pripravkov** ali pripravek **Universalis**, ki hkrati deluje tudi proti **oidiju vinske trte**. Na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vpliva tudi uporaba **žveplovih pripravkov**, ki poleg tega zavirajo razvoj populacij **pršic trsne kodravosti (akarinoza)** in **trsnih listnih pršic šiškarič (erionza)**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**



Slika: Črna pegavost na šparonih vinske trte.

Besedilo: Primož Žigon