

## ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU

19. april 2019

Razvoj ozimnih ječmenov je različen, odvisno od območja pridelave, sorte in tehnologije pridelave. V hladnejših legah rastline pretežno še kolenčijo, v toplejših območjih in legah pa je razvoj nekoliko hitrejši. Sušno vreme v marcu je onemogočalo razvoj bolezni, zato so posevki dokaj zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljati znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (*Septoria nodorum*). Priporočamo pregledovanje njiv! V posevkih, kjer opazite znamenja okužbe z različnimi pegavostmi na približno polovici rastlin priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so **Archer max, Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Zantara** in podobni.

V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opazate ali samo posamezne pegice in nameravate ječmen škropiti samo enkrat pa priporočamo, da počakate z rabo fungicida do faze BBCH 49 (ko opazite nabrekanje listne nožnice in so konice resic komaj vidne). S škropljenjem v tem obdobju boste zatrli tudi ječmenovo ramularijsko pegavost, ki se pokaže šele po klasenju, vendar je takrat več ni mogoče zatirati.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača. Dokler opazate samo hrošče in odložena jajčeca, ličink pa ne, dodajanje insekticida ni smiselno. Insekticide uporabite v primeru preseženega praga zatiranja (1 ličinka na bil oz. 10 ličink/m<sup>2</sup>).

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**



Slika: Ozimno žito v fazi kolenčenja

Besedilo: Marjeta Urbančič Zemljič