

Porova zavrtalka

8. april 2019

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v fazi razvoja listne mase, spomladanska čebula, česen in por pa so še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov. Po pregledu nekaj nasadov smo v toplejših območjih na nekaterih čebulnicah že opazili odrasle muhe in znamenja, ki jih povzročajo s hranjenjem. Znamenja se kažejo na listih v obliki drobnih belih pik, nanizanih v vrsto. Škodljivka se na listih hrani nekaj dni, z odlaganjem jajčec pa naj bi pričela, ko je število pik v vrsti večje od sedem. Kjer omenjenih znamenj še ne opazate, je priporočljivo pokrivanje rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo, saj s tem preprečite muhi dostop do rastlin in odlaganje jačec. Kjer so znamenja naleta že vidna, lahko v nasadih česna in šalotke uporabite sredstvo **Perfekthion**. Raba sredstva je dovoljena največ dvakrat v rastni dobi.

Upoštevajte sredstvu priložena navodila za uporabo!



Slika 1: Porova zavrtalka (*Napomyza gymnostoma*) na mladi čebuli.



Slika 2: Znamenja naleta porove zavrtalke v obliki drobnih belih pik.

Besedilo: Neja Marolt