

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

13. maj 2019

Nadaljuje se razmeroma hladno in deževno vreme, ki ustvarja ugodne razmere za primarne, kot tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom. Hitro priraščajoči poganjki in plodiči so občutljivi za okužbe. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškopite **pred napovedanimi padavinami** z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so **Antracol, Antracol WG 70** (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), **Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena, ki vam onemogoči pravočasno obnovitev fungicidne obloge, je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov z zdravilnim učinkom kot so **Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC** in **Domark 100 EC**. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojava odpornosti vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko, priporočamo, da škropilni brozgi dodate enega izmed žveplovih fungicidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!



Slika 1: Cvetna monilija – simptomi bolezni na poganjku jablane (foto arhiv KIS)



Slika 2: Jabolčna grizlica-poškodba na plodiču (foto arhiv KIS)

Besedilo: Matic Novljan