

24. februar 2020

KAPARJI NA AMERIŠKIH BOROVNICAH

Razmeroma visoke dnevne temperature so spodbudile razvoj sadnih vrst in njihovih škodljivcev. Na grmih ameriških borovnic je že mogoče opaziti dejavne nimfe kaparjev. Nimfe se selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje z oljnim pripravkom **Ovitex**. Priporočamo pozorno pregledovanje nasadov. V kolikor opazite prisotnost nimf, je potrebno opraviti zatiranje.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškopimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!



Slika: Nimfe kaparjev na lesu ameriške borovnice (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije