

30. marec 2020

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVRTIC PRED MONILIJO

Ob pregledih nasadov borovnic še ne opažamo apotecijev monilije ameriških borovnic. Kljub temu, lahko ob naslednjih obilnejših padavinah lahko pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje tal v nasadu. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemsko delujočih fungicidov kot je **Score 250 EC**, **Mavita 250 EC** ali **Folicur EW 250**. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek **Serenade ASO**.



Slika: Brstenje grmov ameriških borovnic (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije