

6. april 2020

VARSTVO ČEBULNIC

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zavrtačke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, zaradi česar se listi zvijajo in rastline slabše rastejo. Kjer znamenja naleta v obliki belih drobnih pik še niso vidna, lahko rastline zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V česnu in šalotki je za zatiranje čebulne muhe in porove zavrtačke registriran insekticid **Perfekthion (v uporabi do 30. 6. 2020)** v odmerku 0,6 l/ha (največ 2 tretiranja). V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje različnih grizočih in sesajočih žuželk registriran insekticid **Karate Zeon 5 CS** v odmerku 0,15 l/ha (največ 2 tretiranja).



Slika: porova zavrtačka na čebuli (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije