

6. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je v fazi brstenja. Na toplejših vinogradniških legah so brsti pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, že v stadiju volne (BBCH 05). V teh vinogradih lahko sedaj že opravite škropljenje z žveplovimi pripravki, ki v tem času učinkujejo na zmanjšanje populacije **trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza)** in **pršic trsne kodravosti (akarinoza)**. Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ki delujejo tudi proti **oidiju** in zmanjšujejo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**. Za optimalno delovanje žveplovih pripravkov je potrebno škropljenje opraviti v obdobju višjih temperatur zraka (vsaj 15 °C) in v suhem vremenu.

Dokler je vinska trta še v fazi nabrekanja brstov lahko za zatiranje **rdeče sadne pršice** in **gabrove pršice** opravite škropljenje s pripravkom **Red fox**, ki vsebuje mešanico parafinskega olja in bakrovega oksida. Pripravek učinkuje tudi na zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo.

V vinogradih bodite pozorni na pojav **zemljemerke** in **drugih škodljivih gosenic**, ki z povzročajo poškodbe z izjedanjem očes v času brstenja. Gosenice so aktivne ponoči, zato v primeru njihove prerasnožitve priporočamo preglede vinogradov v nočnem času in njihovo ročno odstranjevanje.



Slika: poškodbe brstov zaradi zemljemerke in drugih škodljivih gosenic (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije