

6. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razmeroma toplo in suho vreme je zelo ugodno za razvoj jablan in hrušk. Hruške so na najtoplejših območjih že odcvetele, med tem ko se na hladnejših območjih vzcvetajo. Jablane jim sledijo – na najtoplejših območjih, sorte, ki so zgodnejše v razvoju že pričenjajo cveteti. Suho vreme ni ugodno za širjenje večine glivičnih obolenj, vseeno pa lahko ob naslednji večji količini dežja pričakujemo izbruhe spor jablanovega škrlupa in primarne okužbe.

Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite pripravek na osnovi A.S. dodin kot sta **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC** (uporaba v času cvetenja zaradi fitotoksičnosti ni priporočljiva). Uporabite lahko tudi katerega izmed dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF**, ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Toplo in suho vreme je ugodno za širjenje jablanove pepelovke. Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito – tekoče žveplo**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.



Slika: Hruške v polnem cvetenju (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije