

13. april 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Uporaba žveplovih pripravkov v času brstenja vinske trte vpliva na zmanjšanje populacije **trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza)** in **pršic trsne kodravosti (akarinoza)**. Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ki delujejo tudi proti **oidiju** ter črni pegavosti. V času začetne rast mladice in razvoja prvih lističev mlade poganjke okužuje gliva povzročiteljica **črne pegavosti vinske trte**. Okužbe so pogostejše v deževnem vremenu, predvsem na občutljivih sortah kot so na primer Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Preprečevanju okužb je potrebno več pozornosti nameniti zlasti v vinogradih, kjer se je bolezen v preteklih letih že pojavila. Za varstvo pred črno pegavostjo lahko uporabite katerega od registriranih kontaktnih fungicidov kot so **Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF** ali bakrov pripravek **Cuprablau Z 35 WG oz. WP**. Uporabite lahko tudi pripravek **Universalis**, ki hkrati deluje tudi proti oidiju. Škropljenje z omenjenimi pripravki opravite pred napovedanimi padavinami in sicer dvakrat v obdobju 7-10 dni, pri čemer prvič škropite, ko so poganjki dolgi 1-2 cm.



Slika: Prvo škropljenje proti črni pegavosti vinske trte opravimo, ko so poganjki dolgi 1-2 cm

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije