

VARSTVO ŽIT

5. maj 2020

Ozimni ječmeni so sedaj večinoma že v klasenju ali pa bodo vsak čas, tudi pozne sorte v hladnejših območjih. V tem obdobju lahko posevke zavarujete pred glivičnimi boleznimi, predvsem pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo, v kolikor tega še niste opravili. Bolezen se običajno pojavi v fazi nalivanja zrn, vendar je takrat za zatiranje že prepozno, zato jo je treba zatirati preventivno. Za škropljenje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara** in podobni.

Zadnje padavine so močno pospešile tudi razvoj pšenic, posevki imajo večinoma že razvite vse liste. Zgornji trije listi so poleg klasov najbolj pomembni za polnjenje zrn, zato je važno, da čim bolj dolgo ostanejo zdravi. Priporočamo, da jih sedaj preventivno zavarujete pred glivičnimi okužbami s fungicidom. Uporabite lahko katerega od že navedenih pripravkov kot so **Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara** ali tudi **Magnello, Prosaro, Zamir** in podobne.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **rdečega listnega strgača**. Sedaj so se začele pojavljati že tudi ličinke, ki lahko v kratkem času močno poškodujejo listno maso. Okvirni prag zatiranja ličink je dosežen, če je v povprečju na vsaki bili ena ličinka. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Bulldock 25 EC, Fastac 100EC, Decis, Poleci, Karate zeon 5 CS, Evure, Mavrik 240, Biscaya** in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!



Slika: Ozimni ječmeni so že v fazi klasenja, medtem ko imajo posevki pšenice večinoma že razvite vse liste (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije