

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

11. maj 2020

Na mladih kapusnicah so se začele pojavljati gosenice **repnega** in **kapusovega belina**, zato priporočamo redno in natančno pregledovanje posevkov, saj lahko gosenice v zgodnji fazi razvoja hitro spregledamo. Bodite pozorni tudi na znamenja navzočnosti drugi pomembnejših škodljivcev kapusnic, zlasti bolhačev, stenic in sovk. V primeru močnejšega napada lahko gosenice zatirate s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V integrirani pridelavi lahko uporabite sredstva: **Coragen**, **Bulldock EC 25**, **Decis 100 EC**, **Fastac 100 EC**, **Karate Zeon 5 CS**, **Karis 10 CS**, **Steward** ali **Mimic**. V ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje gosenic uporabite pripravke **Agree WG**, **Delfin WG** in **Lepinox plus** na osnovi bakterije *Bacillus thuringiensis*.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika 1: Gosenice repnega belina lahko povzročajo veliko škodo na kapusnicah in ostalih križnicah (foto arhiv KIS)



Slika 2: Gosenice kapusovega belina na zelju (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije