

OBVESTILO O VARSTVU SOLATNIC

11. maj 2020

Z otoplitvijo vremena so se v nekaterih posevkih solate začele pojavljati **listne uši**, zlasti zelena krompirjeva uš. Priporočljivo je najmanj enkrat tedensko pregledovanje posevkov od roba njive, kjer se populacije uši najprej naselijo. V kolikor so rastline v razvojni fazi tik pred formiranjem glave in število uši na posamezno rastlino presega 20, je priporočljiva raba insekticida. Na prostem lahko za zatiranje listnih uši v solati uporabite sredstva: **Mospilan 20 SG**, **Sivanto Prime**, **Closer**, **Movento SC 100** in **Pirmior 50 WG**. Uporaba slednjih dveh pripravkov je dovoljena tudi v zavarovanih prostorih. V ekološki pridelavi sta za zatiranje listnih uši na voljo **Biotip floral** na osnovi piretrina in **Naturalis** na osnovi glive *Beauveria bassiana*.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika 1: Zelena krompirjeva uš na solati (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije