

## VARSTVO OZIMNE PŠENICE

18. maj 2020

Ozimne pšenice so sedaj večinoma že sklasi in prehajajo v fazo cvetenja, razvoj je odvisen od sorte in območja pridelave. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimprej po zaključenem klasenju zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so **Prosaro, Caramba, Plexeo, Sirena** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **rdečega žitnega strgača**. Okvirni prag zatiranja ličink je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Poleci, Sparviero, Evure, Mavrik 240** in podobni.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**



Slika: Začetek cvetenja ozimne pšenice (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije