

VARSTVO KROMPIRJA

25. maj 2020

Zaradi obilice padavin v zadnjem obdobju so tla večinoma povsod dobro namočena in krompir hitro raste. Predvsem na njivah, ki so bile do nedavnega pod prekrivko, so rastline velike in bujne. Ob nadaljevanju nestanovitnega vremena se bo povečala nevarnost za pojav krompirjeve plesni, zato priporočamo, da nasade krompirja zavarujete s fungicidom. V tem obdobju hitre rasti priporočamo za začetno škropljenje predvsem rabo fungicidov s sistemskim delovanjem kot sta **Infinito** (karenca 7 dni) ali **Proxanil 450 CS** (karenca 14 dni). Uporabite lahko tudi **Ridomil gold MZ pepite** (karenca 21 dni), vendar ga svetujemo samo za začetno škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave. Kasneje njegovo rabo odsvetujemo zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Lahko uporabite tudi fungicid **Ranman top** ali **Orvego**, ki sta manj podvržena izpiranju. Oba imata karenco 7 dni.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde**, **Biscaya**, **Bulldock EC 25**, **Calypso SC 480**, **Coragen**, **Mavrik 240**, **Mospilan 20 SG** in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite **Raptol koncentrat**, **Laser plus** ali **Neemazal-T/S**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!



Slika: Nasad krompirja (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije