

VARSTVO VINSKE TRTE

25. maj 2020

Vinska trto je v času pred cvetenjem potrebno ustrezno zavarovati pred okužbami. Vremenske razmere so zaradi pogostih ploh zelo ugodne predvsem za razvoj **peronospore**. V tem obdobju svetujemo preventivno uporabo najzanesljivejših fungicidov s kombiniranim dotikalnim in sistemskim oz. polsistemskim delovanjem. Pri izbiri dajte prednosti pripravkom na osnovi aktivne snovi fosetil-Al (**Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F** ipd.) ali metalaksil (**Folpan gold, Ridomil MZ pepite** ipd.). Primerni so tudi pripravki na osnovi aktivne snovi dimetomorf (**Acrobat MZ WG, Forum star**, ipd.) ali cimoksanil (**Equation pro, Cymbal, Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG, Nautile DG, Profilux, Reboot, Twingo** ipd.). Uporabite lahko tudi druge registrirane pripravke kot so **Ampexio, Revus, Pergado MZ/D/F, Emendo F** ali **Valis F**. Za varstvo pred **oidijem** uporabite pripravke na osnovi aktivnih snovi iz skupine triazolov (**Folicur EW 250, Luna Experience, Baltazar, Orius 25 EW, Score 250 EC, Dinaly, Topas 100 EC** ipd.) ali druge registrirane pripravke kot so **Collis, Custodia, Luna Max, Misha 20 EW, Nativo 75 WG, Prosper CS 300, Sercadis, Talendo extra, Vivando** idr. Za varstvo pred oidijem škropilni brozgi dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!



Slika: Socvetje (kabrnk) vinske trte pred cvetenjem (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije