

VARSTVO PLODOVK PRED RESARJI

15. junij 2020

Na plodovkah opažamo povečan pojav cvetličnega in tobakovega resarja. Ličinke in odrasli resarji lahko s prehranjevanjem deformirajo liste, cvetove in plodove rastlin. Plodovi lahko dobijo srebrnkaste lise, na katerih pogosto opazimo drobne črne iztrebke. Obe vrsti resarjev sta pomembni prenašalki virusa pegavosti in uvelosti paradižnika (TSWV). Resarje lahko spremljate z modrimi lepljivi ploščami, ki jih postavite v posevek ali pa njihovo prisotnost potrdite s podrobnim pregledom cvetov s pomočjo lupe. Za zatiranje resarjev lahko na plodovkah uporabite **Biotip floral, Botanigard WP, Botanigard OD, Confidor 70 WG, Karate Zeon 5 CS, Kohinor SL 200, Laser plus, Naturalis, Neemazal – T/S, Requiem prime, Sivanto prime, Vertimec pro**.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!



Slika: Resarji na cvetu paprike (Foto: arhiv KIS)

VARSTVO PARADIŽNIKA PRED SIVO PLESNIJO, PARADIŽNIKOVO PLESNIJO IN OKROGLO LISTNO PEGAVOSTJO

Pridelovalce paradižnika opozarjamo, da se v zavarovanih prostorih zaradi visoke zračne vlage lahko pojavi siva plesen, ki povzroča odmiranje cvetov. Priporočljivo je redno zračenje rastlinjakov in odstranjevanje okuženih rastlin. Uporaba fungicidov je priporočljiva še pred pojavom bolezenskih znamenj, v zavarovanih prostorih so vam na voljo **Amylo-X**,

Polyversum, Prolectus, Serenade Aso, Switch 62,5 WG. Sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami in toplim vmesnim vremenom so ugodne tudi za razvoj in širjenje paradižnikove plesni na prostem. Po dežju lahko uporabite pripravke kot so **Acrobat MZ WG, Armetil M, Avtar 75 NT, Copforce extra, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Forum MZ WG, Galben M, Gett, Kocide 2000, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mirador 250 SC, Nautila DG, Nordox 75 WG, Ortiva, Pergado C, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Polyram DF, Revus, Ridomil Gold MZ Pepite, Zaftra AZT 250 SC.** Na paradižniku na prostem opažamo tudi okroglo listno pegavost paradižnika, ki jo prepoznamo po ovalnih pegah svetlejše barve, obrobljene z rjavim robom, v sredi teh pa se pojavijo črna trosišča. Za zatiranje okrogle listne pegavosti paradižnika pri nas ni registriranega pripravka, vendar nekatera sredstva za zatiranje črne listne pegavosti in paradižnikove plesni, učinkovito zatirajo tudi to bolezen.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

VARSTVO ČEBULE PRED ČEBULNO PLESNIJO IN RESARJI

Vremenske razmere so še vedno zelo ugodne za širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da čebulo ponovno zaščitite pred boleznijo z uporabo katerega izmed registriranih fungicidov za ta namen: **Armetil M, Ridomil Gold MZ Pepite, Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat** ali katerega izmed pripravkov na osnovi azoksistrobina, kot so **Chamane, Mirador 250 SC, Ortiva, Penncozeb 75 DG, Zaftra AZT 250 SC** ali **Zoxis 250 SC.** Priporočamo tudi pregledovanje rastlin na prisotnost resarjev, za zmanjšanje številčnosti lahko uporabite **Laser 240 SC, Laser plus , Karate Zeon in Perfekthion (do 30. 6. 2020).**

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije