

Nedišeča trirobka

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.



J F M A M J J A S O N D



Obdobje vznikanja

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost

Splošno Enoletna širokolistna rastlina, ki dobro uspeva predvsem na vlažnih, s hranili bogatih tleh.

Rastišče Njivske površine, ruderalna območja, vrtovi.

Mlada rastlina Klični listi so majhni, eliptični z zaokroženim vrhom, so dolgopecljati. Prvi in naslednji pravi listi so gladki, pernatno deljeni, na kratkem peclju ali brez njega.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina v višino meri od 20 do 80 cm. Rastlina je brez vonja. Običajno je steblo enojno ali v zgornjem delu razvejeno. Spodnji listi izraščajo v obliki rozete, kasneje premenjalno nameščeni. Listi so gladki, kratkopecljati, 2 do 3 krat pernatno deljeni. Roglji so ozki in dolgi, koničasti.

Cvetenje Rastlina cveti od junija do oktobra. Cvetovi so na koncu poganjkov nameščeni v koških, ki dajejo vtis enega cveta. Koški so veliki od 3 do 5 cm. Jezičasti cvetovi na obodu so bele barve, v notranjosti so zlatorumeni cvetovi. Socvetišče je polkrožno do stožčasti in je polno (ni votlo).

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi so rožke brez kodeljice, ploščate oblike.

Posebnosti Rastlina ima zelo velik razmnoževalni potencial.

Zatiranje Mehansko zatiranje na obdelovalnih površinah (česanje ali plitva obdelava) je najbolj učinkovito, ko so rastline še majhne. Košnja pred cvetenjem je lahko učinkovit ukrep ob pojavu na pašniku, travniku. Rastlina je v poljščinah zahtevna za zati ranje zaradi slabše učinkovitosti nekaterih registriranih herbicidnih sredstev.



Pripravil: Andrej Vončina

2019 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije. Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.