

VARSTVO VINSKE TRTE

29. junij 2020

V vinogradih, kjer je od prejšnjega škropljenja minilo več kot 10 dni, je potrebno obnoviti fungicidno oblogo. Mladi grozdiči so v tem obdobju še posebej občutljivi za okužbe z **oidijem**. Za varstvo pred omenjeno boleznijo svetujemo uporabo zanesljivejših pripravkov s sistemskim oz. polistemičnim ali translaminarnim načinom delovanja kot so **Baltazar, Collis, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250 Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Sercadis, Score 250 EC, Spirox D, Star tebukonazol, Systhane 20 EW, Tebusha 25% EW, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn** ali **Vivando**, ki jim dodajte tudi **žveplo** v zmanjšanem odmerku. Nevarnost pojava **peronospore** je še vedno velika, zato priporočamo, da za preprečevanje okužb ponovno uporabite enega od pripravkov s sistemskim oz. polsistemskim načinom delovanja kot so **Acrobat MZ WG, Ampexio, Armetil M, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Emendo F, Equation pro, Folpan Gold, Fortuna gold, Forum MZ WG, Forum star, Fudan Gold, Magma Triple WG, Mikal Flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG/ WP, Moximate plus, Orvego, Pergado MZ/D/F, Profilux, Profiler, Reboot, Revus, Ridomil gold MZ pepite, Sfinga extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Valis M** ipd. Uporabite lahko tudi druge kombinirane pripravke s translaminarnim delovanjem kot so **Daimyo F, Enervin, Electis 75 WG, Mildicut, Sanvino, Videryo F** ali **Vincy F**.

Ob visokih dnevniških temperaturah zraka (nad 25 °C), svetujemo, da opravite škropljenje v jutranjem ali večernem času, ko je nanos škropilne brozge boljši in manjša možnost pojava fitotoksičnosti zaradi uporabe žveplovih pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije