

VARSTVO KOŠČIČARJEV

15. marec 2021

Breskve in nektarine

Breskve in nektarine so v fazi zaključka brstenja, vršički prvih zelenih listov so že dobro vidni, tudi cvetni brsti so močno nabrekli. To obdobje je kritično za okužbe mladih listov z glivo povzročiteljico breskove kodravosti. Za aktualno varstvo pred omenjeno boleznijo je ustrezna uporaba pripravkov na podlagi aktivne snovi dodin. Škropljenje s pripravkoma **Syllit 400 SC** ali **Syllit 544 SC** obvezno opravite pred napovedanimi padavinami.

Marelice

V času cvetenja marelic je priporočljivo opraviti varstvo pred cvetno monilijo. Do okužb v primeru mokrega vremena z visoko relativno zračno vlago, zato je škropljenje potrebno opraviti preventivno pred napovedanimi padavinami. Na voljo so naslednji pripravki: **Amylo-X** (tudi v ekološki pridelavi), **Chorus 50 WG**, **Duaxo koncentrat**, **Mavita 250 EC**, **Prolectus**, **Score 250 EC**, **Serenade ASO** (tudi v ekološki pridelavi), **Signum**, **Switch 62,5WG**, **Topsin-M** in **Zenby**. Škropljenje prvič opravimo, ko je odprtih najmanj 10 % cvetov in ga nato po potrebi ponovimo v času polnega cvetenja.



Marelica v fazi tik pred cvetenjem (balonski stadij)
(foto arhiv KIS)

Češnje, višnje in slive

V nasadih češenj, višenj in sliv, ki so še v fazi brstenja, je za preventivno varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev še vedno možna in priporočljiva uporaba pripravkov na osnovi bakra. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Badge**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP** ali **Champion 50 WG**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pripravila: David Snoj, Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije