

## OBVESTILA O VARSTVO KOŠČIČARJEV

6. april 2021

### Cvetna monilija

Padavine v obdobju cvetenja koščičarjev ustvarjajo ugodne pogoje za okužbe s **cvetno monilijo**. Na večini opazovanih lokacij zgodnje sorte breskev že zaključujejo s cvetenjem, češnje in višnje so v polnem cvetenju, cveti tudi večina sort sliv in češpelj. Sadjarji naj ukrepe varstva prilagodijo razmeram v nasadih. Škropljenje z registriranimi pripravki je smiselno opraviti dvakrat; prvič škropimo, ko je odprtih 10% cvetov ter drugič v fazi začetka odpadanja venčnih listov. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami.

Na češnjah in višnjah so registrirani pripravki **Duaxo koncentrat, Luna experience, Signum, Amylo-x, Zenby** ter samo na češnjah **Prolectus, Serenade ASO, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500** ali **Topsin-M**.

Na breskvah in nektarinah lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov **Amylo-X, Chorus 50 WG, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG** ali **Zenby**.

Za varstvo sliv pa so namenjeni pripravki **Amylo-X, Chorus 50 WG, Luna experience, Prolectus, Serenade ASO, Switch 62,5 WG, Topsin M** ali **Zenby**.



Slika: Koščičarji so v fazi cvetenja občutljivi za okužbe s cvetno monilijo (foto arhiv KIS)

### Češpljeva grizlica

V času cvetenja sliv priporočamo, da izobesite bele lepljive plošče za spremljanje rumene in črne češpljeve grizlice. Če je konec cvetenja presežen prag škodljivosti (skupno ujetih 30 osic) takoj po cvetenju uporabite insekticidni pripravek **Mospilan 20 SG**.

#### **Upoštevajte veljavne registracije in sredstvom priložena navodila!**

Pripravek **Mospilan 20 SG** je nevaren za čebele in druge oprasovalce. Zato je pomembno, da zatiranje opravimo šele takrat, ko slive povsem odcvetijo. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v času nočnem ali večernem času oz. takrat, ko so čebele v panjih.

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič  
Kmetijski inštitut Slovenije