

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

6. april 2021

Nasadi hrušk so v polnem cvetenju, medtem ko je glavnina sort jablan v fazi rdečega popka oz v balonskem stadiju in tik pred pričetkom cvetenja. Padavine v obdobju zadnjih dni že omogočajo prve primarne okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem svetujemo ponovno uporabo enega od kontaktnih fungicidov kot so **Syllit 400 SC**, **Syllit 544 SC** (uporaba v času cvetenja ni priporočljiva zaradi možnih ožigov), **Avtar 75 NT**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 DG**, **Pinozeb M-45Na**, **Alcoban**, **Delan PRO**, **Polyram DF**. Ekološki sadjarji lahko uporabijo tudi sredstvo **Curatio-žvepleno apnena brozga**.



Slika: Hruške v polnem cvetenju (foto arhiv KIS)

Toplo in suho vreme v preteklem tednu je bilo ugodno za razvoj jablanove pepelovke, v nasadih je bilo že moč opaziti prve simptome bolezni. Trenutne vremenske razmere so manj ugodne za okužbe. Sadjarjem kljub temu priporočamo dodajanje žveplovih pripravkov, vendar le v času, ko dnevne temperature presežejo 15°C. Uporabite lahko sredstva kot so **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol specilal**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Microthiol disperss**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol sulphur 800 SC**, **Vertipin**, **Symbiotica Fito** –tekoče žveplo ali **Azumo WG**.



Slika: Znamenja okužbe mladih lističev z jablanovo pepelovko (foto arhiv KIS)

Jabolčna in hruševa grizlica

Pred cvetenjem svetujemo začetek spremljanja naleta jabolčne in hruševe grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč. Te je potrebno namestiti čim višje, na zgornjo žico armature, da so dobro vidne. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo 30 osic. Proti grizlicam se ukrepa šele ob koncu cvetenja.

Listne uši in drugi škodljivci

Pred cvetenjem začnite s spremljanjem pojava listnih uši. Bodite pozorni predvsem na mokasto uš in v primeru preseženega praga škodljivosti (1-2 koloniji na 100 pregledanih poganjkov) opraviti škropljenje še pred cvetenjem z enim od pripravkov kot so **Teppeki**, **Afinto**, **Sivanto prime** (mladi nasadi) ter **NeemAzal-T/S** v ekoloških nasadih jablan.

V nasadih lahko do cvetenja proti ameriškemu kaparju in hruševi bolšici uporabite sredstvo **Harpun**.

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pripravili: David Snoj in Primož Žigon
Kmetijski inštitut Slovenije