

VARSTVO ČEBULNIC IN SOLATNIC

15. 4. 2022

Razvoj **porove zavrtalke** je zaradi sušnega in pretežno hladnega vremena upočasnen. Znamenja naleta v obliki drobnih belih pik v glavnem še niso vidna, zato lahko rastline zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje posevka ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje čebulne muhe registriran pripravek **Benevia**, v odmerku 0,75 l/ha. Za zatiranje grizočih žuželk lahko v čebulnicah uporabite tudi sredstvo **Karate Zeon 5 CS**, v odmerku 0,15 l/ha. Priporočljivo je pregledovanje posevkov in ukrepanje v primeru pojava znamenj naleta.



Slika 1: Porova zavrtalka na listu čebule (foto arhiv KIS)

V zavarovanih prostorih se na solati pojavljajo listne uši, zato je smiselna raba insekticidov v primeru njihove prereznožitve. Za zatiranje listnih uši na prostem in v zavarovanih prostorih lahko na solatnicah uporabite sredstva **Asset five**, **Biotip floral**, **Flora verde**, **Movento SC 100**, **Naturalis**, **Pirimor 50 WG**, na prostem pa insekticide **Closer**, **Mospilan 20 SG** in **Sivanto prime**.



Slika 2: Listne uši na solati (foto arhiv KIS)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pripravila: Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije