

## VARSTVO KAPUSNIC

21. 4. 2022

Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih kapusnic opazili prva odložena **jajčeca kapusove muhe**. Jajčeca so bela, podolgovata in odložena tik ob koreninski vrat. Priporočamo pregledovanje rastlin. Tam, kjer je izvedljivo priporočamo, da rastline po sajenju prekrijete s kopreno, da žuželkam preprečite dostop do rastlin. Za zatiranje kapusove muhe je v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in brstičnem ohrovту registriran insekticid **Benevia**. Gre za sredstvo z dotikalnim in želodčnim delovanjem, ki ga lahko uporabite v razvojni fazi od devetih pravih listov pa vse do tehnološke zrelosti kapusnic. Ob sajenju glavnatega zelja, ohrovta, listnatega ohrovta in kitajskega kapusa se lahko za zmanjšanje škode, ki jo povzroča kapusova muha, zadela v tla granuliran talni insekticid s kontaktnim delovanjem **Columbo 0,8 MG**.

V zavarovanih prostorih se na križnicah - redkvici in rukoli pojavljajo **bolhači**. Škodljivce je smiselno zatirati na mladih rastlinah, ki so bolj občutljive na poškodbe bolhačev. V rukoli gojeni na prostem je za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo bolhači dovoljena uporaba insekticida **Force evo** in **Karate Zeon 5 CS**.



Slika: Poškodbe na listih redkvice, ki jih povzročajo bolhači (foto: arhiv KIS).

**Pred rabo insekticida natančno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca!**

Pripravila: Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije