

VARSTVO ŽIT

22. april 2021

Močne ohladitve vremena v aprilu so upočasnile rast žit in plevelov. Rastline zaostajajo v razvoju za en do dva tedna in so sedaj pretežno v začetnih obdobjih kolenčenja. V hladnejših območjih imajo razvit en do dva kolena (BBCH 31-32), v toplejših območjih tudi tri (BBCH 33), odvisno od lege, sorte in časa setve. V razmeroma hladnem vremenu, ko dnevne temperature še ne dosegajo 20 °C, je tudi razvoj bolezni upočasnjen. Ponekod so opazne poškodbe žit po pozebi, do katere je prišlo 7. in 8. aprila. Kjer še niste uspeli zatirati plevelov priporočamo, da ukrep izvedete čimprej, ob tem pa še naprej pazite na temperature, ki se ob jutih še marsikje spustijo skoraj do ledišča. Zatiranje bolezni sedaj večinoma še ni potrebno. Priporočamo pa redno pregledovanje posevkov in spremljanje zdravstvenega stanja žit.

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Tabela: Herbicidi za zatiranje plevelov v žitih (iz baze FFS, marec 2021)

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe	Pleveli
Adentis, Corida, Flame, TBM 75 WG tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolence in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 31-39)	Enoletni širokolistni pleveli; ko so v fazi intenzivne rasti in imajo razvit šesti list
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1	P zgodaj spomladi, v razvojnem stadiju od dveh listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Njivski lisičji rep in širokolistni pleveli
Alliance diflufenican + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	Enoletni širokolistni pleveli
Ally SX, Finy, Savvy metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T v jarih ž.: od drugega lista do zastavičarja (BBCH 12- 39); v oz. ž. od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21- 39)	Enoletni širokolistni pleveli
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2 - 0,33	P, T od treh listov do drugega kolence (BBCH 13-32)	Enoletni ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli
Axial pinoksaden	0,6 - 1,2	P, J od treh listov do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni ozkolistni pleveli, ko so v razvojni fazi od 1-6 listov ali ko imajo razvita 3-4 kolena.
Axial one florasulam + pinoksaden	1 - 1,3	P, J od prvega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Nekateri širokolistni in ozkolistni pleveli
Basagran 480	2,0	P, J, O, R, T	Nekateri širokolistni pleveli

bentazon		od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega lista do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Enoletni in večletni širokolistni plevli
Boudha metsulfuron + tribenuron	0,02	P, J, R, T (oves: manjše uporabe) od začetka razraščanja in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 21-39)	Enoletni širokolistni plevli
Bonaca, Flurostar 200, Starane forte, Tandus 200, fluroksipir	0,6 - 0,8	P, J, R, T od dveh razvitih listov do zastavičarja (BBCH 12-39)	Enoletni širokolistni in nekateri večletni širokolistni plevli
Clyde FX florasulam + fluroksipir	1,5	P, J, O, R, T od faze šest stranskih poganjkov in najdlje do stopnje zastavičarja (BBCH 26-39)	Enoletni in večletni širokolistni plevli
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170 - 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolena (BBCH 21-31)	Ozkolistni in širokolistni plevli
Duplosan KV, mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)	Širokolistni plevli; tretirati pri temperaturah zraka višjih od 12°C, oz. razmerah, ki pospešujejo rast posevka (toplota, vlaga).
Duplosan KV 600 mekoprop – P	1,5	P, J, O, R, T med razraščanjem žit (BBCH 13-29)	
Ergon metsulfuron-metil + tifensulfuron-metil	0,06-0,07	P, JJ od razvitih dveh listov do faze zastavičarja (BBCH 12-39);	Enoletni in večletni širokolistni plevel
Emcee MCPA	1,0	P, J, O, R, T Jara ž.: od treh listov do drugega kolena (BBCH 13 - 32) Oz. ž.: od prvega kolena do zastavičarja (BBCH 31 - 39)	Širokolistni plevli; v času tretiranja naj bodo plevli v zgodnjih razvojnih fazah in aktivno rastoči.
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75 - 1,0	P, J, T Od konca razraščanja do drugega kolena (BBCH 22-32)	Enoletni širokolistni plevli
Grodyl amidosilfuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavljanja zgornjega lista (BBCH 13-37)	Širokolistni plevli
**Granstar super 50 SX tifensulfuron-metil + tribenuron-metil	0,06	P, J, O, R, T od faze, ko imajo žita razvitih 7 listov, do drugega kolena (BBCH 17 do 32)	Širokolistni plevli **zaloge v uporabi do 31.7.2021
Herbocid XL	1,25	P, J, R, T	Enoletni in večletni širokolistni plevli

2,4-D		od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	
Hussar OD jodosulfuron	0,1	P, J, R, T Oz. ž.: od začetka razraščanja do zgornjega lista (BBCH 21 do 37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13 do 29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni ter nekateri večletni širokolistni pleveli; Najboljše delovanje, ko je ozkolistni pl. v fazi dveh listov in do konca razraščanja, in širokolistni pl. v fazi 2 - 6 listov.
Hussar plus jodosulfuron + mezosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolenca (BBCH 13–32).	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli; Najboljše delovanje, ko imajo širokolistni pl. 2–4 liste, ozkolistni pl. pa od začetka do sredine razraščanja.
Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075 - 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4 - 0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolenca (BBCH 21-31)	Enoletni širokolistni pleveli
Mustang forte 2,4 D + aminipirid + florasulam	0,8 - 1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli; ko imajo 2-6 listov
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 - 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolenca (BBCH 12-32)	Ozkolistni in širokolistni pleveli
Quelex flurasulam + halaoksifen-metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Sekator OD amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	P, J, R, T oz. ž.: od tretjega lista do začetka razvoja zgornjega lista (BBCH 13-37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13-29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli ter nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela
Xanadu bensulfuron metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T oz. ž. : od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jara ž.: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni širokolistni pleveli; najboljše rezultate se doseže, če se tretira majhne aktivno rastoče plevele.

P-pšenica, J-ječmen, JJ-jari ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Priprava: Meta Urbančič Zemljič
Kmetijski inštitut Slovenije