

## VARSTVO AMERIŠKIH BOROVRTIC

3. maj 2021

Ameriške borovnice počasi začenjajo s cvetenjem. V tem obdobju je izjemno pomembno varovanje cvetov pred sekundarnimi okužbami z monilijo ameriških borovnic. Kljub temu, da v letošnjem letu vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj apotecijev ter primarne okužbe, pridelovalcem svetujemo preventivno varstvo. Hkrati je potrebno cvetove borovnic zavarovati pred okužbami z nekaterimi drugimi povzročitelji bolezni, ki povzročajo antraknozo in sivo plesen. Za ta namen lahko uporabite enega izmed naslednjih fungicidnih sredstev **Signum, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Serenade ASO, Amylo-X** ali **Taegro**. Pri zgodnjih sortah, ki še brstijo lahko za varstvo pred borovničevo monilijo do cvetenja uporabite sredstva na osnovi a.s. difenkonazol kot so **Folicur EW 250, Mavita 250 EC** ali **Score 250 EC**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja.**



Slika: Nasad ameriških borovnic med cvetenjem (foto arhiv KIS)

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič

Kmetijski inštitut Slovenije