

VARSTVO KOŠČIČARJEV

10. maj 2021

Toplo vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne razmere za razvoj in širjenje glivičnih okužb na listju koščičastih vrst sadja. Za varstvo pred boleznimi kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja svetujemo rabo fungicidov z dotikalnim delovanjem, s katerimi je potrebno škropiti pred napovedanimi padavinami.

V nasadih češenj in višenj lahko uporabite enega od pripravkov kot so **Avtar 75 NT**, **Delan 700 WG**, **Dithane DG neotec**, **Dithane M-45**, **Luna Experience**, **Merpan 80 WDG**, **Manfil plus 75 WG**, **Signum**, **Syllit 544 SC**, **Syllit 400 SC** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**. Samo na češnjah lahko uporabite tudi sredstvi Mankoz 75 WG in Merpan 80 WDG. Za varstvo sliv in češpelj so na voljo sredstva **Delan 700 WG**, **Luna Experience**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**, **Signum**, ali **Curatio-žvepleno apnena brozga** ter za breskve in nektarine **Delan 700 WG**, **Luna Experience** ali **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Pozorni bodite na pojav škodljivcev kot so siva breskova uš, črna češnjeva uš, češpljeva grizlica idr., proti katerim lahko v primeru prerasmnožitve ukrepate z registriranimi insekticidi.

Insekticidni pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast!



Slika: Listna luknjičavost na češnji (foto arhiv KIS)

Pripravil: David Snoj

Kmetijski inštitut Slovenije