

## ZATIRANJE BOLEZNI V ŽITIH

11. maj 2021

Otoplitev vremena v minulih dneh je pospešila razvoj rastlin, vendar je dosežena stopnja razvoja žit še naprej različna, odvisno od območja pridelave, sorte, rastišča in roka setve. Ob napovedanem nestanovitnem vremenu lahko pričakujemo ugodne razmere za razvoj in širjenje glivičnih bolezni. Priporočamo redno pregledovanje njiv.

V posevkih **ozimnega ječmena**, ki so pretežno v obdobju razvoja listne nožnice ali klasa (od BBCH 41 do 51 dalje) priporočamo rabo fungicidov za zavarovanje pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Bolezen se običajno pojavi po zaključenem klasenju, vendar je takrat za rabo fungicidov že prepozno, zato jo zatiramo preventivno. Uporabite katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Seguris xtra**, **Siltra xpro**, **Zantara** ali **Retengo**.

Rabo fungicidov priporočamo tudi v posevkih **pšenice**, kjer imajo rastline razvite že vse liste. Ker so zgornji trije listi poleg klasov najbolj zaslužni za polnjenje zrn in pridelek, je važno, da čim bolj dolgo ostanejo zdravi. Priporočamo, da jih preventivno zavarujete s katerim od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Seguris xtra**, **Siltra xpro**, **Prosaro**, **Zamir**, **Magnello** in podobni.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**



Slika: Ko so na rastlinah vidne konice res je pravi čas za zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič