

VARSTVO OZIMNIH ŽIT

16. 5. 2022

Ob toplem vremenu in dobri namočenosti tal je razvoj žit pospešen, pogoste padavine vplivajo ugodno tudi na razvoj povzročiteljev bolezni, zato priporočamo redno pregledovanje njiv.

Posevki ozimnih ječmenov sedaj večinoma klasijo ali začenjajo s cvetenjem (BBCH 50-60), v hladnejših območjih so še v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 41-49). Kljub temu, da je zdravstveno stanje posevkov v splošnem dobro, jih je treba sedaj preventivno zavarovati pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo, v kolikor tega še niste storili. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro, Delaro forte, Elatus era, Priaxor EC, Revycare, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara** ipd. ali tudi **Retengo**, ki omejuje pojave neparazitskih listnih pegavosti, ki jih težko ločimo od ječmenove ramularijske pegavosti. V kolikor ste prvo škropljenje s fungicidom izvedli že med kolenčenjem, po približno dveh tednih posevki niso več zavarovani.

Tudi posevki **ozimne pšenice** se sedaj pospešeno razvijajo. Večinoma imajo že razvit zgornji list (zastavičar) in prehajajo v obdobje razvoja listne nožnice (od BBCH 39 dalje). Za pridelek so poleg klasa najbolj zaslužni zgornji trije listi, zato je važno, da ostanejo čim bolj dolgo zdravi. Preventivno jih zavarujte pred glivičnimi okužbami s katerim od fungicidov kot so **Ascra xpro, Delaro forte, Elatus era, Priaxor EC, Mirador forte, Magnello, Prosaro, Revycare, Siltra xpro, Zamir** in podobni.

Na listih opazamo tudi že prve **ličinke žitnega strgača**. Priporočamo pregledovanje posevkov. Zatiranje z insekticidi se priporoča, če v povprečju opazate 1-2 ličinki na bil. Uporabite lahko katerega od sledečih pripravkov: **Delux 050 CS, Evure, Mavrik 240 EW, Karate zeon 5 CS**. Škodljivci se lahko pojavljajo samo na posameznih delih njiv, v takih primerih škropljenje po celotni površini ni potrebno.

Natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!



Pripravila: Meta Urbančič Zemljič