

## VARSTVO OZIMNIH ŽIT

30. 5. 2022

Ozimni ječmeni so sedaj večinoma v fazi mlečne zrelosti. V tem obdobju varstvo pred glivičnimi okužbami ni več smiselno, še naprej pa priporočamo spremljanje populacij **ličink žitnega strgača** in zatiranje po potrebi. Okvirni prag zatiranja je presežen, če v povprečju najdete 1 do 2 ličinki na bil. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so **Delux 050 CS, Evure, Mavrik 240 EW ali Karate zeon 5 CS**.

Ozimne pšenice in tritikale so večinoma v fazi polnega cvetenja, nekatere poznejše sorte v hladnejših legah začenjajo s cvetenjem. V obdobju od konca klasenja in med cvetenjem je čas za zavarovanje zgornjih listov in klasov pred glivičnimi okužbami. V kolikor tega še niste storili, opravite škropljenje čim bo možen prehod na njive, saj je hladno vreme z obilnimi padavinami v minulih dneh ustvarilo ugodne razmere za širjenje glivičnih okužb listov in klasov. Za varstvo lahko uporabite katerega od kombiniranih fungicidov s protiokonazolom kot so **Ascra Xpro, Delaro forte, Elatus era, Prosaro, Siltra Xpro** ali katerega od fungicidov z metkonazolom (**Caramba, Sirena, Plexeo**), lahko v kombinaciji s pripravki, ki vsebujejo tebukonazol (**Tebusha 25 % EV, Buzz ultra DF, Zamir** in podobni) ali protiokonazol (**Protendo 300 EC, Promino 300 EC, Tartaros 300 EC**). Po možnosti izberite sredstva z drugimi aktivnimi snovmi, kot ste jih uporabili za prvo škropljenje. Od prejšnje rabe fungicidov naj preteče vsaj 14 dni.

Tudi v posevkih pšenice in tritikale opažamo številčne populacije **ličink žitnega strgača**. Preglejte posevke in po potrebi dodajte katerega od zgoraj navedenih insekticidov.



Slika: Cvetenje pšenice (foto arhiv KIS)

**Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi varstva čebel škropljenje z insekticidi opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko so čebele v panjih.**

Pripravila: Meta Urbančič Zemljič