

VARSTVO VINSKE TRTE

7. junij 2021

Na večini vinogradniških leg je glavčina sort vinske trte v fazi razvoja kabrnkov, medtem ko na toplejših območjih nekatere sorte že cvetijo. Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte je še vedno zelo velika. Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva in rabo fungicidov v 8 do 10 dnevnih razmikih. V tem najbolj občutljivem obdobju razvoja in intenzivne rasti vinske trte priporočamo zlasti uporabo kombiniranih kontaktnih in sistemičnih fungicidov na osnovi metalaksila (**Armetil M, Ridomil gold MZ pepite, Folpan gold**) ali fosetil-Al (**Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Magma Triple WG ali Momentum trio**). Uporabite lahko tudi druge pripravke s kombiniranim kontaktnim in polsistemičnim delovanjem kot so **Acrobat MZ WG, Ampexio, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75 WG, Daymio F, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fortuna gold, Forum MZ WG, Forum star, Fudan Gold, Gett, Mildicut, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orondis, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Pergado SC, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Valis M, Videryo F, Vincy F ali Zorvec Zelavin**.

Za varstvo pred oidijem škropilni brozgi dodajte enega od registriranih pripravkov s sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so **Baltazar, Collis, Difcor 250 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF ali Vivando**, ki jim dodajte **žveplo** v zmanjšanem odmerku. Za zatiranje oidija v ekološki pridelavi poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10, Taegro in Sonata**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Besedilo: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije