

VARSTVO ZELENJADNIC PRED RESARJI

20. 6. 2022

Na zelenjadnicah v zavarovanih prostorih se pojavljajo resarji. Priporočljivo je pregledovanje nasadov in ukrepanje predno se škodljivci izrazito namnožijo. Ličinke in odrasle žuželke s prehranjevanjem povzročajo srebrnkasta razbarvanja, ki jih opazimo zlasti na listih in plodovih. Resarji z vbodi poškodujejo tudi rastne vršičke in cvetove. V preteklem tednu smo poškodbe resarjev opazili predvsem na fižolih. Na prostem lahko za zatiranje resarjev na fižolu uporabite insektcid **Laser plus**, v zavarovanem prostoru pa **Requiem prime**. Na plodovkah lahko za ta namen uporabite sredstva: **Biotip floral**, **Flora verde**, **Karate Zeon 5 CS**, **Laser 240 SC**, **Laser plus**, **Naturalis**, **Neemazal –T/S**, **Requiem prime** ali **Vertimec pro**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!



Slika: Srebrnkasta razbarvanja na spodnji strani listov fižola, ki jih povzročajo resarji s prehranjevanjem (foto arhiv KIS).

Pripravila: Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije